

## OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Str.Dragos Voda nr.13 Loc GALATI  
Telefon /Fax :0236/495244  
e-mail :ofgalati@anfof.ro

## BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.19.din11.05.2023





**Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat aparitia si dezvoltarea daunatorului/bolii:**

MANA CEPEI+THrips,AFIDE,ALTI DAUNATORI

**Care pot cauza pierderi importante la culturile:CEAPA(ptr. bulbi,samanta,arpagic)**

**Pentru preventie si combatere se recomanda executarea tratamentului; 1**

**Mană cepei(Prenospora destructor).**



Atacul afecteaza atat cultura de ceapa pentru bulbi,cat si culturile de seminceri si de producere arpagic. Mană la ceapa se manifesta pe frunze si tulpinile florifere. Pe acestea apar pete galbene,concentrice,in dreptul carora se observa un puf cenusiu -violaceu. Frunzele si tijele plantelor atacate se inmoiaze si se frang in dreptul zonei afectate (asa incat in partea superioara se usuca) cazand la pamant. In cazul unui atac puternic, sunt atacati si bulbii, acestia ramanand mici, iar in timpul depozitarii se inmoiaze si putrezesc. Transmiterea bolii de la un an la altul este asigurata prin sporii ce raman in resturile vegetale si bulbii infectati. In vegetatie se raspandeste prin conidii. Boala apare in toate culturile de ceapa atunci cand vremea este ploioasa si rece si este foarte pagubitoare in special pentru culturile de seminceri de ceapa.

Tripsul comun(*Thrips tabaci*)



Larvele si adultii se gasesc, in principal, in spatiul ingust dintre frunzele tubulare de ceapa de unde sug seva plantei. Aceste celule isi pierd culoarea lor normala, iar tesutul apare cu pete albicioase sau dungi argintii. Daune substantiale pot fi provocate plantelor tinere in special celor ce apartin soiurilor cultivate direct din seminte. Intregul ciclu de viata (cu la adult) dureaza aproximativ 19 zile. Ouale sunt plasate individual doar sub epiderma frunzelor succulente. Ecloziunea are loc in 4-5 zile. Dezvoltarea larvara este completa in aproximativ 9 zile. Adultii au culoare care variaza de la galben pal pana la maro inchis iar aripi sunt de culoare gri murdar. Pentru a combate dezvoltarea populatiei de tripsi, in perioadele calde, si uscate, sunt necesare tratamente repeatate, la intervale de 7-10 zile.

**Folositi unul din produsele de mai jos dupa caz:**

- temperatura aerului peste 6-27 °C cu optimum 11-12°C
- umiditatea relativă a aerului mai mare de 85% (cer acoperit, ceata, rouă, apa liberă)
- precipitatii intermitente cel putin 10 ore.

**Folositi unul din produsele de mai jos dupa caz:**

1. ALIETTE 80WG : 2,0kg/ha + KARATE ZEON/NINJA(NINJA): 0,2 litri/ha sau
2. ALCUPRAL 50PU: 4,0-5,0kg/ha + MOSPILAN 20SG/KRIMA20SG: 0,2 kg/ha sau
3. POLYRAM DF: 2,0kg/ha + + BENEVIA: 0,75 l/ha sau sau
4. CAPTAN 80WDG: 1,5kg/ha + MOVENTO 100SC: 0,75 litri/ha sau
5. ZORVEC ENICADE: 0,2 litri/ha + MOSPILAN 20SP/GAZELLE: 0,075litri/ha sau

**ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMODOLOGATE**

**ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMODOLOGATE PE TERITORIUL ROMANIEI**

**Masuri alternative de :** biologice, fizice, mecanice .

**Metode durabile :** biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigură control corespunzător organismelor daunatoare.

**Perioada optima de tratament; 11.-15.05.2023**

**Alte recomandari :** Tratamentul se va efectua pe timp liniștit fără precipitații și se va respecta timpul de pauza de la tratament până la consum în funcție de produsul utilizat, se va avea grijă ca pulverizarea să fie foarte fină. Tratamentul se va repeta după 10 zile.

**REGULA-NU SE FAC DOUA TRATAMENTE LA RAND CU ACELAS PRODUS DE PROTECTIE A PLANTELOR.**

**ATENȚIE !RESPECTAȚI CONDIȚIILE DE DEPOZITARE,MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE,CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR",ELABORAT DE AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ.**

Se recomanda a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP- pe culturi și se vor păstra pe o perioadă de cel puțin 3 ani. Aceasta cerință este obligatorie conform Ordinului nr. 352 / 2015 privind normele de ecoconditionalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 10). Conform HG.1230/2012 art.3 alin 2, nerespectarea de către utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67, alin 1 din Reg (CE) 1107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizează se sanctionează cu amenda de la 8000 la 10 000 lei.

**Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului înconjurător.** Citiți cu mare atenție instrucțiunile de pe eticheta produsului de protecție a plantelor, inclusiv recomandările privind compatibilitatea produselor utilizate la tratamentele fitosanitare! Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător! Respectați cu strictețe normele de protecție și securitate a muncii. Protejați familiile de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor conform Legii nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr.127/1991 al ACA din România, Ordinului comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației 15b/3404/1991/ al Departamentului pentru Administrație Locală și 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum și Protocolului de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMPIS privind implementarea legislației. Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici privind utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor. Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Singuranța Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare. **BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.**

Responsabil Prognoza și Avertizare,

Ing .Huciuc Maria-Angela